

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EPIFANÍA AG**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRICOLA****GRANULOS DISPERSABLES (WG)****COMPOSICIÓN:**

Indoxacarb 300 g/Kg
 Aditivos c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 2940 - SENASA**Indoxacarb****Nombre Químico (IUPAC):** : (S)-7-chloro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl)-carbamoyl]-2,5-

dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, methyl ester

CAS N°: 173584-44-6**Fórmula empírica:** C₂₂H₁₇ClF₃N₃O₇**Peso molecular:** 527.8**Capacidad y tipo de envases:**


Bolsa Trilaminada y botella twin :

100 g , 150g, 200g, 250 g,

Bolsa trilaminada: 0.5 Kg, 1 Kg,

2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 100 KG

Tambor: 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 100 KG

Fórmula Estructural:**TITULAR DEL REGISTRO:****GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura -Paita - Paita, Perú .

Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937

info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area WEIFANG, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**NOVAGRO-AG S.A.C**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona

Especial de Desarrollo Piura-Paita-Paita, Perú.

Teléfono: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas
 y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese , lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabon.
- Ningun envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Oxadiazine

- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestion no inducir al vomito.
- No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, cuidando que los parpados esten levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabon.
- En caso de ingestion, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfono de emergencia:
SAMU :106
ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA: (01) 2663828

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
- Evitar la deriva del viento.
- Notificar a los apicultores carcanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EPIFANIA-AG® es un insecticida de contacto e ingestión. Bloquea el transporte de sodio a través de la membrana de ciertas células nerviosas, lo que provoca la parálisis y muerte del insecto afectado

PREPARACION DE LA MEZCLA

Coloque la cantidad de EPIFANIA-AG® a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	(días)	(mg/Kg)
PIMIENTO	Gusano comedor De hojas	Spodoptera frugiperda	0.115 - 0.125	14	0.3

P.C.: Periodo de Carenza.

LMR: Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximos dos aplicaciones por campaña de EPIFANIA-AG® con un intervalo de aplicación de 14 días, en etapa de floración del cultivo y cuándo se observen los primeros síntomas de la plaga después de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:

12 Horas

COMPATIBILIDAD

EPIFANIA-AG® es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos

FITOTOXICIDAD:

EPIFANIA-AG® No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

