

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"****"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS****Grupo químico: Oxadiazine**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito.
- No administre nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfono de emergencia:

SAMU : 106  
ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA: (01) 2663828**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
- Evitar la deriva del viento.
- Notificar a los apicultores carcanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**EPIFANIA AG****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRICOLA****GRANULOS DISPERSABLES (WG)****COMPOSICIÓN:**

Indoxacarb ..... 300 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Registro PQUA N° 2940 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura-Paita - Paita, Perú

Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937

info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD**

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

https://www.rainbowagro.com/

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:****NOVAGRO-AG S.A.C**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona

Especial de Desarrollo Piura-Paita-Paita, Perú.

Teléfono: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto : 50 Kg

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

EPIFANIA-AG® es un insecticida de contacto e ingestión. Bloquea el transporte de sodio a través de la membrana de ciertas células nerviosas, lo que provoca la parálisis y muerte del insecto afectado.

**PREPARACION DE LA MEZCLA:**

Coloque la cantidad de EPIFANIA-AG® a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO  | PLAGA                   |                              | DOSIS         | P.C.   | LMR     |
|----------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------|---------|
|          | NOMBRE COMÚN            | NOMBRE CIENTIFICO            | Kg/ha         | (días) | (mg/Kg) |
| PIMIENTO | Gusano comedor De hojas | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.115 - 0.125 | 14     | 0.3     |

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña de EPIFANIA-AG® con un intervalo de aplicación de 14 días, en etapa de floración del cultivo y cuándo se observen los primeros síntomas de la plaga después de la aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**

12 Horas

**COMPATIBILIDAD**

EPIFANIA-AG® es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos

**FITOTOXICIDAD**

EPIFANIA-AG® No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**TAMBOR**