

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CELERA®

## 70 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid..... 700 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 710 - SENASA

**Titular del registro:**

**POINT ANDINA S.A.**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono +51 (01) 348 1018

**Formulado por:**

**POINT AGRO-CHINA Ltd**

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510)8785 1001



*Soltagro*®

**Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.**

**Importado y Distribuido por:**

**Soluciones Técnicas del Agro S.A.C**

Av. Guillermo Dansey N°2176

Lima - Cercado

Telf: (01) 3368645 Fax: (01) 3368299

**Contenido Neto: 0.5 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto es peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo ó nube de aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoides.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón por 15 -20 minutos.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15 minutos mantenga los párpados abiertos.
- En caso de inhalación: mover al paciente al aire fresco, inmediatamente suministrar respiración artificial. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: dar al paciente suficiente agua. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito, llamar al médico.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA: POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018  
SAMU: 106; CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	60	7	8
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	80	3	0.05
Vid	Chinchas harinosos	<i>Pseudococcus viburni</i>	40	21	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados (partes por millón)

- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CELERA 70 WP** es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Las aplicaciones de **CELERA 70 WP** se realizan en campo abierto. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 l/ha)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

El número de aplicaciones va a depender del grado de infestación de la plaga generalmente es entre 1 a 2 aplicaciones por campaña y los momentos de aplicación son al inicio de las primeras infestaciones. No aplicar en época de floración.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**CELERA 70 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

