Exclusive®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Cyromazine..... 750 g/Kg
Aditivos.....c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA Nº 1874 - SENASA

Grupo Químico: Avermectinas.

Nombre Químico: N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

Formula Empírica: $C_6H_{10}N_6$

Peso Molecular: 166.19 g/mol

Formula Estructural:



NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: sólido
Color: blanco
Inflamabilidad: no inflamable
Explosividad : no explosivo
Corrosivo: no corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:
70g, 100g, 200g

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St. Margarets Grove, Twickenham TW1 1JG
United Kingdom
Tel. (44-20) 8892 3862

Importado y Distribuido por:
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C
Av. Guillermo Dansey N°2176.
Lima - Cercado
Telf: (01) 3368645 Fax: (01) 3368299

Soltagro®
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacía aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazinas
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones. • En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua durante 15 minutos. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evita almacenar por encima de los 35 °C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EXCLUSIVE es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de Liriomyza huidobrensis afectando la muda y empupamiento. **EXCLUSIVE** aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en papa, tomate y haba. Se recomienda aplicar **EXCLUSIVE** al inicio de las primeras minas ubicadas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.**EXCLUSIVE** se emplea diluido en agua, preparar una premezcla distribuyendo la cantidad necesaria de **EXCLUSIVE** en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación. **EXCLUSIVE** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra. Se recomienda una segunda aplicación a los 7 ó 14 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar a las 48 horas después de aplicado el producto. después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
Alcachofa	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	70	140	7	3.0
Frejol			70	140	7	3.0
Haba			70	140	7	5.0
Holantao			70	140	7	5.0
Papa			70	140	21	0.8
Tomate			70	140	7	0.5

P.C.: Período de Carencia.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA