

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico con mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106**  
**NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# XILOTROM

EXTRACTO VEGETAL

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

**Composición:**

1,8-cineol ..... 10 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. N° 122-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
**NEOAGRUM S.A.C.**

 neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
 Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

ARVENSIS AGRO, S.A.

Ctra. Castellón Km 226,9 Polígono Prydes.

La Cartuja (Zaragoza), ESPAÑA.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

XILOTROM es un fungicida biológico de origen vegetal, que actúa por contacto contra hongos fitopatógenos, ocasionando el incremento de la permeabilidad celular, destrucción y pérdida del citoplasma. Además, impide el acceso del patógeno a las plantas, dañando la germinación de esporas y crecimiento de micelio. Por otro lado, también afecta la mitosis y división celular, impidiendo la multiplicación del hongo. XILOTROM está producido en base a extractos vegetales, por lo que no deja residuos químicos sobre la fruta cosechada y reduce el riesgo de desarrollo de resistencia de la enfermedad objetivo. Se recomienda efectuar la aplicación al final de la tarde o durante la noche para prevenir una posibilidad de fitotoxicidad. XILOTROM se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Arandano	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	-	N.A.	N.A.
Banano	Pudrición blanda	<i>Dickeya chrysanthemi</i>	0.3 - 0.5	-	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	4 - 6	N.A.	N.A.
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	-	3 - 4	N.A.	N.A.
	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.7	-	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia

N.A.: no aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

XILOTROM es una herramienta esencial como alternativa de rotación y prevenir resistencia dentro de una estrategia cero residuos en programas de control de fitopatógenos foliares. Se recomienda hasta 02 aplicaciones en los cultivos de arandano, banano, palto y vid; considerando una campaña al año. Aplicar cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno y se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:**

XILOTROM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes y sustancias fuertemente ácidas y alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

14.0 ± 0.3 cm

2.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

