

100 L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a larga. Ligera irritación al tracto respiratorio
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en las primeras horas de la mañana.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión reciente del producto, preparar una solución de suero salino y proceder al lavado gástrico y aspiración. Finalmente administrar 15 g de carbón activado (absorbente) en una solución de 20 gramos de sulfato de sodio (laxante) con 500 cc de agua.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, en caso de existir dificultad respiratoria, practicar respiración artificial.
- ANTIDOTO: No existe antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PENZOLE 100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Penconazole 100 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° 952-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701, Urb. El
Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area Weifang,
Shandong 262737, China
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**SOLANDINA PERU SAC**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701, Urb. El
Rosedal, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 100 L

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PENZOLE 100 EC es un fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y antiesporulante. Se absorbe por las hojas con traslocación acropétala. Inhibe la síntesis de ergosterol en la membrana celular, deteniendo el crecimiento del hongo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.20	7	0.2
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.10-0.12	14	0.2
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	14	0.06

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al aparecer los primeros síntomas de ataque de la enfermedad con buen mojado. Realizar como máximo de 2 aplicaciones por campaña, para pimiento y vid. Para alcachofa, aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la plaga, realizar una aplicación por campaña considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta después de 24 horas

COMPATIBILIDAD

PENZOLE 100 EC es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

