

REACTIVADO®
EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Extracto de orégano 40 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro N°0124 - SENASA - PBA - EV

TITULAR DEL REGISTRO:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

FORMULADO POR:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

DISTRIBUIDO POR:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe serutilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- Realizar aplicaciones en dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada después de usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc., llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo, triturándolo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CROPS PROTECTION: 044-201643

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

PRECAUCIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL
PRODUCTO

- Apariencia: Líquido.
- Color: blanco a crema
- Olor: característico a orégano.
- Estabilidad en el almacenamiento: REACTIVADO® es estable en su envase original sellado y almacenado a temperatura ambiente por 2 años.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

Presentaciones del producto:
Envases PEAD de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 20L, 200 L,1000L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REACTIVADO® es un producto desarrollado a base de extracto de orégano con acción fungicida de contacto.

REACTIVADO® es un extracto botánico que actúa afectando la germinación de las esporas y el micelio del hongo. El extracto de orégano ejerce una acción a nivel de las membranas mitocondriales por la disminución del potencial de membrana evidenciando una acción fungicida.

-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plagas	Nombre común	Nombre científico	Dosis L/200 L	PC	LMR
Arándano	Podredumbre gris	Erysiphe	Botrytis cinerea	0.6 - 0.8	N.A.	N.A
			Erysiphe elevata	0.5 - 0.6	N.A.	N.A
Vid	Oidiosis		Erysiphe necator	0.5 - 1.0	N.A.	N.A

N.A.: No aplica

P.C.: Período de carencia
L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de seis aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días en cualquier etapa del cultivo de manera preventiva o si hay síntomas de la enfermedad.

Aplicar la dosis mayor cuando se presente mayor presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede ingresar área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIÓN

