



ESPEJO'S GRAF

CAJA: SIR-ONE 1 Kg (20 unid- x 50 g)

Fecha: 11-09-2023

Producto Cian

Producto Magenta

Producto Amarillo

Producto Negro

CMYK

Serfi

Medida: 23 x 14.5 x 21 cm

Material: Carton duplex Maule 345 g

Impresión: Tira

Texto: Arial 10 puntos

23 cm

14.5 cm

SIR-ONE

SIR-ONE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Emamectin benzoate 100 g/kg
Lufenuron 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2438-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
AGROHAO COMPANY LTD.
Rm501, No.1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East Xunlian Road, Shanghai, China.

Contenido Neto: 1 Kg (20 unid 50 g)

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4068

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



23 cm

14.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SIR-ONE es un insecticida formado por dos ingredientes activos: **Emamectin benzoate** (no sistémico, penetra a las hojas por movimiento translaminar, actúa por ingestión y tiene alguna acción por contacto) y **Lufenuron** (actúa por ingestión, y si es ingerido durante el estado larval, puede evitar la eclosión de los huevos posteriormente).

Para aplicar **SIR-ONE** hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es necesario que el equipo esté en buenas condiciones, bien calibrado y cuente con un buen sistema de agitación.

Se recomienda usar **SIR-ONE** en las siguientes condiciones: evitar realizar la aplicación bajo el sol de mediodía y/o altas temperaturas, no aplicar con lluvia y/o viento evitando así la pérdida del producto por deriva o lavado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS Kg/cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico			Emamectin benzoate	Lufenuron
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.06	37	0.01	0.01
Arroz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.06	40	0.01	0.01
Espárrago	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.055	7	0.01	0.02
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.05 - 0.075	35	0.01	0.01
Páprika	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.055	7	0.02	0.8
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.055-0.060	7	0.02	0.4

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En los cultivos de arándano, arroz, espárrago, maíz, páprika y tomate:

Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga y los ataques estén en una etapa inicial.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año. Se debe rotar con otros insecticidas de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SIR-ONE no es compatible con ácidos fuertes ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos artrópodos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

