AMAZOTE 5% WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate..... 50 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° SENASA

Titular del Registro: **ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.**
Dirección: Calle Pucalá 324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Departamento de Lima - Perú

Importador y Distribuidor:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.
Dirección: Calle Pucalá 324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Departamento de Lima - Perú

Formulador:

Qingdao Agro-unitek Crop-science Co. Ltd
Dirección: No 63 Haier Road, Qingdao, China

LOTE N° :
FECHA DE FAB. :
FECHA DE VCTO.:

CONTENIDO NETO: 100 g

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: **Avermectina**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
Teléfono del titular del registro: +51 983275666

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de este envase inutilicelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Nocivo par la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMAZOTE 5% WG, insecticida no sistémico que penetra en los tejidos de las hojas por su movimiento translaminar.
Es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de Gusano del cesto "Oiketikus kirbyi" en el cultivo de palto.

AMAZOTE 5% WG es un insecticida que interrumpe los impulsos nerviosos de las larvas, las cuales dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente; luego de ello el insecto muere.

AMAZOTE 5% WG se prepara diluyendo la dosis indicada en recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGA		Dosis kg/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	"Gusano del cesto"	*Oiketicus kirbyi*	0.07	14	0.01

PC: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar **AMAZOTE 5% WG** con una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Se recomienda la aplicación del **AMAZOTE 5% WG**, cuando se observe la presencia de la plaga en el cultivo.
- Rotar con otros insecticidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **AMAZOTE 5% WDG** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA