EVISECT®-S

EVISECT®-S

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CISPROQUIM: 080-050-847 Teléfono de la empresa: (01) 221-5729



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición: Thiocyclam-hydrogenoxalato.

Reg. Nº 109-96-AG-SENASA

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C. Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague Jesús María - Lima - Perú Arysta

Nippon Kayaku Co., Ltd. 1-1, Marunouchi 2-chome, Chi Tokyo, Japón NIPPON KAYAKU

Serfi

de Lote: ontenido Neto: 800 g (4 uds. de 200g)

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

EVISECT[®]-S

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbrineris spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estructura química esta periodes esta y principarse y principarse y principarse. acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dossi indicada en 1 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	%	(días)	(ppm)
Ají, Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20		N.D.	3
Alcachofa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.30-0.40	0.15-0.20		N.D.	3
	Gusano defoliador	Heliothis virescens					
Algodón	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurberiella	0.5			15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	Alabama argillacea					
	Gusano menor de la hoja	Anomis texana					
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci		0.1	0.05	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20		N.D.	3
	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda					
	Gusano defoliador	Copitarsia turbata					
	Thrips	Thrips tabaci		0.1	0.05		
Granado	Thrips	Thrips tabaci		0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Palto	Thrips del palto	Heliothrips haemorrhoidalis		0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	0.70	0.35		15	3
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.30-0.40	0.15-0.20			
Vid	Thrips	Thrips tabaci		0.1	0.05	14	3
Papa	Polilla de la papa	Phthorimaea operculella	0.60			N.D.	0.01
	Thrips	Thrips tabaci	0.20-0.30			N.D.	0.01

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodonero deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

NO INFLAMABLE

















