

141.52 mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Uso: Insecticida agrícola


Grupo químico: Análogo de la nereistoxina

Tipo de formulación: Polvo Soluble (SP)

Nro. de Registro Nacional: N°109-96-AG-SENASA

Nombre químico: N,N-dimethyl-1,2,3-trithian-5-ylamine-hydrogen-oxalate.

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₇H₁₃NO₃S₃

Peso molecular: 271.4

Propiedades físico-químicas:

Estado físico: Sólido.

Color: Blanquecino hasta beige

Olor: Característico

pH: 2-3 (1% en 500 ppm agua dura)

Clase y capacidad de los envases:

Bolsas de 0.2 kg, 0.25 kg, 0.50 kg, 1 kg y 25 kg

Cajas de 200 g, 400 g, 800 g y 800g (4uds. de 200g)

Tambor de 40 kg

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracras N° 2226 Uto, Olayague
Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

Formulaciones Químicas S.A.
CHOMES-Puntarenas
Tel.: 638-6283 - Costa Rica

Importador y Distribuidor: SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Tel.: 710-4068



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CISPROMQUIM:
080-050-847 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil		
Aji, Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Alcachofa	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberella</i>	0.5	0.1	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	0.5	0.1	15	0.02
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>	0.5	0.1	15	0.02
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	0.1	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	<i>Copieria turbuta</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Thrips del pallo	<i>Heliothis haemorrhoidalis</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.1	0.1	N.D.	3
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.1	0.1	N.D.	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	0.1	N.D.	3

P.C.: Periodo de Carenzia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



182.14 mm