

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Nippon Kayaku Co., Ltd.
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japon



Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-4068



Fecha de Formulación:
N° de lote:
Código de lote: 40 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación: pantalones largos, zapatos cerrados, guantes, gorro y mascarilla.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la penicilina.
- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve el producto al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- En caso de ingestión accidental suministrar leche o agua fresca.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1 cc sistema a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CIPROQUIM: 080-959-347 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe realizarse. Después de usar el contenido húllese la funda o bolsa conteniendo. Entreguella o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Evitar el uso de plaguicidas en el día destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbricaria* spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja. Le cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos mastigadores y Diurra la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulta con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	Nombre científico	DOSIS		PC (g/l)	LIM (ppm)
				Kg/ha	%		
Al. Perenio	Gusano perforador		Heliothis virescens	0.30-0.40	----	N.D.	3
	Mosca minadora		Leptomyza hudsonensis	0.30-0.40	----	N.D.	3
	Gusano defoliador		Heliothis virescens	0.30-0.40	----	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja		Bucculatrix thumellana	0.5	----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja		Acanthia sparganella	0.5	----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja		Acanthia sparganella	0.5	----	15	0.02
Cebolla	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador		Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano copelero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.05	N.D.	3
Espinero	Gusano defoliador		Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano copelero		Spodoptera frugiperda	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador		Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.	3
Granado	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Tripsa del pelo		Heliothis virescens	0.1	0.05	N.D.	3
	Polilla		Tuta absoluta	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Mosca blanca		Bemisia tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Polilla de la papa		Phthorimaea operculella	0.1	0.05	N.D.	3
Papa	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	N.D.	3

LIM: Límite máximo de residuo

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-40