19 cm

22 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Lapras®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Flutriafol.....800 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

INTEROC
Pasión por la innovación

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena Del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO.,LTD.
1165 Beihai Road, Chemical
Industry Zone of Ningbo.
Zhejiang Province - China

7 884927 868274

Contenido Neto: 1Kg

Fecha de Formulación
Número de lote:
Contenido Neto:
Fecha de vencimiento

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

3.30 cm

19 cm

22 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Triazoles
  En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS:
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). SAMU: 106
CIPROSQUIM: 0800-50847. INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LAPRAS® es un fungicida foliar con acción sistémica y de contacto que actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol.
Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear y adicionar la cantidad de LAPRAS® de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar LAPRAS® en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Vid (*Vitis vinifera*)	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.25 – 0.3	21	0.01

Gasto de agua 400 L/Ha
P.C.: = Período de carencia
ppm: Partes por millón

L.M.R.: Límite máximo de residuos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA