

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y ventilados. Evitar la exposición directa a la acción de los rayos solares.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reusarse.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Use el equipo de protección adecuado y completo, necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- El producto es irritante para los ojos y la piel.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

APEX® es un insecticida-acaricida biológico de origen vegetal con acción principalmente de contacto. Contiene sustancias naturales que causan mortalidad, repelencia y disuasión de la alimentación de los individuos plaga.

Sistemas de preparación y aplicación:

Para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. En caso de utilizar máquinas de aplicación mantener los agitadores en funcionamiento. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en la tarde, evitando las horas de mayor radiación solar y alta temperatura.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

APEX® es compatible con la mayoría de los plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina y oxidante.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis recomendada.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L		
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.15	N.A.	N.A.
Arándano	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.15 - 0.20	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

N.A.: No aplica.

