

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

REDIGOLD

PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Cyprodinil 375 g/Kg
Fludioxonil 250 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 2982 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERÚ S.A.C.
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 Dpto. 7A,
Zona Industrial. El Agustino - Lima.
Teléfono: +511 644 - 9297
Correo : contacto@silvestreshanghai.com

Contenido Neto: 250 g

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
CHINA OFFICE
Room 1803, B Zone, Yunting
building, No. 216 Qingguoxiang,
Changzhou, Jiangsu, CHINA
Telf: 0519-88172050



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

"LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cyprodinil (Anilino pirimidine) + Fludioxonil (Phenylpyrrole)

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200L		
Vid	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	0.2	7	3 ¹ 5 ²

P.C. : Periodo de carencia

¹ Cyprodinil, ² Fludioxonil

LMR : Límite máximo de residuos

