

20,4 ± 0,5

PROTURON[®] 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Linuron : 500 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1717 - SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
NANJING HAIGE CHEMICALS CO., LTD
#5-1215, Zhongtai Int'l Plaza, 311 Mid
Jiangdong Road, Nanjing 210019 China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Úreas sustituidas
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300



9,0 ± 0,5

HERBICIDA AGRÍCOLA
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

50 PM
PROTURON[®]

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROTURON[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.
La acción preferente de **PROTURON[®] 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L suelo ligero-suelo pesado	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
ALCACHOFA	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	400*	N.A.	0.05
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
APIO	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZÚCAR	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
ESPÁRRAGO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	400*	1	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
PALTO	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	200 - 400	2	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
PAPA	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	375 - 625	90	0.05
	Mostaza	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>			
ZANAHORIA	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	250 - 500	14	0.2
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

P.C.: Período de Carencia
N.A.: No aplica
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
*Aplicar dosis de 600g/200L de agua en altas infestaciones

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1-2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azúcar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
PROTURON[®] 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



CAJA DE CARTÓN.

Medidas en cm. 14,0 ± 0,5

9,0 ± 0,5

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Linuron : 500 g/kg

Aditivos : c.s.p. 1 kg

Req. PQUA N° 1717 - SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:
**NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.**
Zhenhai District, Ningbo,
Zhejiang Province, China

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Medidas en cm.

14,0 ± 0,5

 $9,0 \pm 0,5$

CAJA DE CARTÓN.

46.0

20,4 ± 0,5

PROTURON[®] 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Linuron : 500 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1717 - SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning District,
Nanjing. China.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: **Úreas sustituidas**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300



9,0 ± 0,5

HERBICIDA AGRÍCOLA
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

PROTURON[®] 50 PM

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROTURON[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. La acción preferente de PROTURON[®] 50 PM es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L suelo ligero-suelo pesado	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	Verdolaga	Portulaca oleracea	250 - 375	N.A.	0.05
	Pata de gallina	Eleusine indica			
ALCACHOFA	Yuyo	Amaranthus dubius	400*	N.A.	0.05
	Hierba de gallinazo	Chenopodium ambrosioides			
APIO	Capulí cimarrón	Nicandra physalodes	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZÚCAR	Cadillo	Cenchrus echinatus	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	Yuyo	Amaranthus dubius	250 - 375	N.A.	0.05
	Chamico	Datura stramonium			
ESPÁRRAGO	Verdolaga	Portulaca oleracea	400*	1	0.05
	Pata de gallina	Eleusine indica			
PALTO	Pega pega	Setaria verticillata	200 - 400	2	0.05
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Mostaza	Brassica rapa ssp. oleifera			
PAPA	Hierba mora	Solanum nigrum	375 - 625	90	0.05
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
ZANAHORIA	Hierba mora	Solanum nigrum	250 - 500	14	0.2

P.C.: Período de Carencia
N.A.: No aplica
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
*Aplicar dosis de 600g/200L de agua en altas infestaciones

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1-2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azúcar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

PROTURON[®] 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



CAJA DE CARTÓN.

9,0 ± 0,5

14,0 ± 0,5

Medidas en cm.

46,0

46.0

CAJA DE CARTÓN.