

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGROPRID 70 WG, está formulado por el ingrediente activo Acetamiprid, es un insecticida de amplio espectro de acción, con actividad sistémica, traslaminar, por contacto y estomacal. Inhibe los receptores de acetilcolina afectando el sistema nervioso central de los insectos.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida **AGROPRID 70 WG** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.05	0.1	1	2.0
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.05-0.06	0.15-0.18	1	2.0
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.07	0.35	14	0.01

P.C.: Periodo de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Arándano: Se recomienda aplicar una aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

Palto: Se recomienda aplicar dos aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña por año, con un intervalo entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

Para los cultivos de Palto y Arándano, terminada la aplicación, se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Evite mezclar con ácido nítrico, ácido sulfúrico, agente oxidante fuerte y agente reductor, no mezclar con pesticida alcalino, como bordex.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Agroprid

70 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Acetamiprid 700 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2989 - SENASA

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru
Teléfono: (01) 6360847



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru
Teléfono: (01) 6360847

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala



ATENCIÓN



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Nombre comercial del producto:

AGROPRID 70 WG

Nombre común: Acetamiprid

Clase: Insecticida Agrícola

Reg. PQUA N°: 2989 - SENASA


Composición:

Acetamiprid 700 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Formula empírica: $C_{10}H_{11}ClN_4$

Peso Molecular: 222.67 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 100 g, 200 g, 250 g, 400 g, 500 g, 800 g

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Gránulo cilíndrico a 20 °C

Color: Blanquecino a 20 °C

Olor: Inodoro a 20 °C

Densidad: 600 g/L (20 °C)

pH: 7.3 a 20 °C

Persistencia a la espuma: 29 mL después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años
a condiciones normales de almacenamiento.

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 6360847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



ATENCIÓN

