

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# AMINAX SUPER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

## Composición:

2,4-D sal amina ..... 720 g/L  
Aditivos ..... C.S.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1444 - SENASA

## Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: +51-1-222-2795

## Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

## Importador y Distribuidor :

CORPORACION GREEN VALLEY

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector Lima - Lima  
- San Martin de Porres  
Teléfono: 953560949

## N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido neto : 10 L

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Chlorophenoxy**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión: NO inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración a cesado o muestra signos de respiración deficiente. Obtener atención médica inmediata.
- ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: + 51-1-222-2795

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi - acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMINAX SUPER es un herbicida de contacto, que controla las malezas hoja ancha indicadas en el cuadro de usos.

## Consulte con un ingeniero agrónomo

| Cultivo        | Plaga        |                               | Dosis      |        | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|
|                | Nombre Común | Nombre Científico             | L/Ha       | L/200L |              |              |
| MAIZ           | Amor seco    | <i>Bidens pilosa</i>          | 2-3        | -      | N.D.         | 0.05         |
|                | Capulí       | <i>Nicandra physaloides</i>   |            |        |              |              |
|                | Chamico      | <i>Datura stramonium</i>      |            |        |              |              |
|                | Hierba mora  | <i>Solanum nigrum</i>         |            |        |              |              |
|                | Verdolaga    | <i>Portulaca oleracea</i>     |            |        |              |              |
|                | Lechera      | <i>Euphorbia heterophylla</i> |            |        |              |              |
|                | Yuyo hembra  | <i>Amaranthus gracilis</i>    |            |        |              |              |
|                | Higuera      | <i>Ricinus communis</i>       |            |        |              |              |
| CAÑA DE AZÚCAR | Coquito      | <i>Cyperus rotundus</i>       | 1.25-1.875 | 1-1.5  | 88           | 0.05         |
|                | Amor seco    | <i>Bidens pilosa</i>          |            |        |              |              |
|                | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i>      |            |        |              |              |
|                | Verdolaga    | <i>Portulaca oleracea</i>     |            |        |              |              |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

N.D.: No determinado

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de AMINAX SUPER se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.  
El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.  
En caña de azúcar, aplicar como máximo 1.875 L/ha.

## PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

AMINAX SUPER es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

## FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

