

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplicar el producto **Extrathion 57 EC** a menos de 40 metros de una fuente de agua.
- No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras formas de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: Organofosforado**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si se ingiere, no inducir al vómito.

**ANTÍDOTO:** Sulfato de Atropina.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106 / FARMAGRO (01)614-1500 / CISPROQUIM:080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. Tóxico para abejas, no aplicar en floración.



**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

Malathion.....623 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

Registro N° 390-97-AG-SENASA

Titular del registro, Formulador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este  
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio  
Central: (01) 614-1500



Contenido Neto: 20L

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Extrathion 57 EC** es un insecticida organofosforado no sistémico con acción de contacto estomacal. Es utilizado en agricultura para el control de un amplio rango de insectos, plagas chupadoras masticadoras, en una gran variedad de cultivos, frutas y vegetales.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **Extrathion 57 EC** recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

**“Consulte con un ingeniero Agrónomo”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/100 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alfalfa	Palomilla	<i>Epinotia aporema</i>	300	7	n.d.
	Empoasca	<i>Empoasca karaemeri</i>			
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>			
Cebolla y Ajo	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300	7	8
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300	7	2
Naranja	Mosca de la fruta. Agregar un Cebo atrayente a base de proteína hidrolizada al 0.4% (400 mL/100 L de agua).		400	7	8
	Querezas: Agregar un aceite agrícola al 0.5% de preferencia.				
	<i>Ceratitis capitata</i>	<i>Anastrepha faterculus</i>			
		<i>Lepidosaphis beckii</i>			
Pimiento	Mosca de la fruta	<i>Ceratitis capitata</i>	400 - 500	3	8
Trigo, Arroz (Granos almacenados)	Picudo del arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>	Directamente a los granos o semillas a razón de 250 mL ó 6 L de agua por tonelada.	n.d.	8
	Picudo de los granos	<i>Sitophilus granarius</i>			
	Palomitas de los cereales	<i>Sitophilus cerealella</i>			
	Barreno menor de los granos	<i>Rhyssopertha dominica</i>	Directamente sobre los sacos 300 mL/100m <sup>2</sup> de superficie de sacos en 4 u 8 L de agua.		
Aplicación sobre granos:	Aplicar a cada nivel de sacos a medida que se van colocando y una vez terminada esta operación rocíese las partes superiores y costados de la fila de sacos.				
Harina de pescado	Dermestes	<i>Dermestes vulpinus</i>	50 mL/L agua. Tratamiento de la bodega de barcos; Sobre la harina ensacada úsese de 300 mL en 10L de agua para 100m <sup>2</sup> de superficie de sacos. Aplicación directa sobre harina de pescado.	n.d.	8
Insectos	Pulgas	<i>Pulex irritans</i>	20 a 50 mL por Litro de agua		
	Chirimachas	<i>Triatoma infestans</i>			

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; n.d.= No determinado

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplique al inicio del ataque de las plagas, use una frecuencia entre aplicación de 7 a 10 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **EXTRATHION 57 EC** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **EXTRATHION 57 EC** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

