

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# SIPERUS<sup>®</sup> 10 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Pyrazosulfuron ethyl..... 100 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA No. 2126-SENASA

Titular del registro:

**ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.**  
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304, Surco  
Lima - Perú

Formulado por:

**JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.**  
N° 88 Rotam Road, ETZDZ, Kunshan,  
Jiangsu 215301 China.  
[www.rotam.com](http://www.rotam.com)



Importado y Distribuido por:

**KALIPTRA LIFE SAC**  
Jr. Joaquín Bernal 764 Of. 102  
Urb. Riso - Lince - Lima  
Tel.: 01-4720746  
Web: [www.kaliptra.com.pe](http://www.kaliptra.com.pe)



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido neto: 250 g

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicina, bebidas ni forraje.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Utilice ropa protectora durante el maneo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua, por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- El tratamiento es sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIAS**

SAMU: 106  
ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 954 313808

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todos los medios necesarios para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SIPERUS 10 WP** es un herbicida sistémico. Actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos esenciales, inhibiendo la enzima acetil lactato sintetasa (ALS) el cual detiene la división celular y detiene el crecimiento de las malezas provocando su muerte.

**SIPERUS 10 WP** aspersión foliar terrestre sobre el follaje previa dilución del producto en agua. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Se realizará una sola aplicación por campaña, en etapa de macollamiento del cultivo y post emergencia de la maleza.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Evite mezclar con agentes fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	0.2	30	0.1

**PC:** Periodo de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos

