

KAMPERO®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA -SC

COMPOSICIÓN

Uniconazole-p..... 50 g/L
Aditivos..... C.s.p. 1 L

Reg. RCP N° 036 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Miraflores de la Mar N° 901, piso 9
Magdalena de la Mar, Lima - Perú
Teléfono: (01) 401-1000



FORMULADO POR:

EFAL AGRI
8, Hamelacha St., P.O.B. 8213
Netanya 42293, Israel

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 5 LITROS

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni dar agua a la persona si está inconsciente. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al médico inmediatamente.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico.
- En caso de EMERGENCIAS llamar al SAMU Telef.: 106 ó CETOX Línea gratuita de emergencias Telef.: 800-0111 & DROKASA PERÚ S.A. Telef.: (01) 401-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inyecte en triturador o perforador y desposite en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques con los desechos de envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o cubrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerdas de riego de mínimo 10 metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva del producto".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KAMPERO es un inhibidor sintético de síntesis de giberelinas. Controla el desarrollo de la planta, la tasa de producción de biomasa y el tamaño de frutos. **KAMPERO** actúa sistemáticamente a nivel de células de las plantas para controlar la síntesis de hormonas.

KAMPERO es usado para incrementar el rendimiento y tamaño de los frutos y para mejorar la forma de los frutos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		%	L/ha		
Palto (<i>Persea americana</i>)	Aplicar en época de floración, cuando se tenga como máximo el 50% de cuaja de frutos. Aplicar en pulverización de gotas finas en forma de lluvia o rocío al área foliar, evitando el chorro.	0,5 - 0,6	5 - 6	N.A.	0,01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña por año. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas al cultivo a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KAMPERO es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso compun a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".