

Tamaño: 12 X 15 23.12.21

Tamaño: 12 X 15

CURADOR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb 640 g/kg
 Cymoxanil 80 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1173-SENASA
 Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Importado y Distribuido por:

Serfi
 Av. República de Panamá 2577
 La Victoria, Lima-Perú
 Teléfono (01) 710-4068

LOTE N° :
 FECHA DE FORM. :
 FECHA DE VCTO. :

CONTENIDO NETO: 200 g.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso, no ingerir
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento en un lugar fresco, seco y con buena ventilación lejos de la casa.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, frutas.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamato + Acetamida
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Teléfonos:
 SAMU: 106
 SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
 - No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURADOR, es un fungicida de contacto con acción translaminar, compuesto de mancozeb y cymoxanil, que actúa impidiendo la producción del ATP y la síntesis del ARN, alterando el metabolismo del hongo, su crecimiento, su germinación y ocasionando su muerte. **CURADOR**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente limpio con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	2,0	7	2,5 ¹ 0,2 ²

PC: Periodo de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos
¹Mancozeb ²Cymoxanil

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (Alta humedad relativa)
- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando 2 campañas/año.
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **CURADOR** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone 355 C	Pantone 293 C	Negro Proceso



■ C100 M0 Y0 K0 ■ C78 M2 Y98 K9
 ■ C0 M30 Y95 K0 ■ K100