

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobirulina + Triazol
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:**
SAMU106; ADAMA Agriculture Perú S.A. (01) 641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Mattok

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
 Azoxystrobin 120 g/L
 Tebuconazole 200 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular de Registro,
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Sucursal Colombia
 Av. El Derby N° 254 Of 306
 Santiago de Surco, Lima - Perú.
 Teléfono: (01)641-0000



Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
 Sucursal Colombia
 Calle 1 C N° 7-53 Interior
 Zona Franca, Barranquilla
 Colombia.

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
 Av. El Derby N° 254 of 306.
 Santiago de Surco, Lima - Perú.



Contenido neto: **500 ml**
 Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Mattok es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad, con un mecanismo de acción combinado que inhibe la respiración mitocondrial del hongo y la enzima C14 demetilasa en la síntesis de esteroides.

Mattok es aplicado en aspersión al follaje con pulverizadoras terrestres de uso corriente. Se recomienda utilizar equipo a motor con gotas finas a medianas para asegurar una buena cobertura. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estadios iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200 L)	(L/ha)* (días)		
Arroz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	-	0.6	35	5 ¹ 1.5 ²
Maiz	Mancha del Asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	0.25 - 0.40	-	15	0.02 ¹ 0.6 ²

* Gasto de agua: Pulverizadora (mochila) a motor 250 L/ha

1- azoxystrobin/2- tebuconazole

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones, considerando dos campañas al año.

Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.

Arroz.- Aplicar desde macollamiento hasta inicio de punto de algodón
Maiz.- Aplicar desde la floración hasta maduración de los granos.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa