

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobirulina + Triazol
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉF. EMERGENCIA:** SAMU 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A. (01) 641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo. **Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.**

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Mattok

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
Azoxystrobin ..... 120 g/L  
Tebuconazole ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 3001-SENASA

Titular de Registro:  
ADAMA Agriculture Perú S.A.  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 641-0000



ADAMA

Formulado por:  
ADAMA Andina B.V.  
Sucursal Colombia  
Calle 1C N° 7-53 Interior  
Zona Franca  
Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:  
AGROKLINGE S.A.  
Av. El Derby N° 254 of 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.



Contenido Neto: 20 Litros

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Mattok** es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad, con un mecanismo de acción combinado que inhibe la respiración mitocondrial del hongo y la enzima C14 demetilasa en la síntesis de esteroides.

**Mattok** es aplicado en aspersión al follaje con pulverizadoras terrestres de uso corriente. Se recomienda utilizar equipo a motor con gotas finas a medianas para asegurar una buena cobertura. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicada en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estadios iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA              |                    | DOSIS       |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                          |
|---------|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------------------------------------|
|         | Nombre común       | Nombre científico  | (L/200 L)   | (L/ha)* |              |                                       |
| Arroz   | Chupadera fungosa  | Rhizoctonia solani | -           | 0.6     | 35           | 5 <sup>1</sup><br>1.5 <sup>2</sup>    |
| Maíz    | Mancha del Asfalto | Phyllachora maydis | 0.25 - 0.40 | -       | 15           | 0.02 <sup>1</sup><br>0.6 <sup>2</sup> |
| Papa    | Tizon temprano     | Alternaria solani  | 0.30        | -       | 15           | 7 <sup>1</sup><br>0.02 <sup>2</sup>   |

\* Gasto de agua: Pulverizadora (mochila) a motor 250 L/ha  
1- azoxystrobin/2- tebuconazole  
P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año para papa y dos campañas para arroz y maíz.

Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.

**Arroz.** - Aplicar desde macollamiento hasta inicio de punto de algodón.

**Maíz.** - Aplicar desde la floración hasta maduración de los granos.

**Papa.** - Aplicar durante la etapa de crecimiento vegetativo hasta tuberización

## PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

La compatibilidad de **Mattok** con otros plaguicidas o fertilizantes no ha sido confirmada localmente. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 330 mm x 200 mm