

Bioestim®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Citoquininas.....	2.0913 g/L
Giberelinas.....	0.0319 g/L
Auxinas.....	0.0302 g/L
Aditivos..... csp /L

Reg. PBUA N° 274 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: Chemical Processes Industries S.A.C.®

Formulado y Distribuido por:

 Calle "E" N° 141 - Urb. Pro 9no Sector Z.I. - S.M.P. - Lima
 Central Telefónica: (511) 536-0487 / 988 106 853
 E-mail: atencionaleliente@cplisac.com
 www.cplisac.com

Fecha de formulación : 0
 Lote N° : 0
 Contenido neto : 22 Litros
 Fecha de vencimiento : 0
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO DE APLICACIÓN:

- La aplicación y manipuleo de Bioestim® debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con el equipo de protección personal (EPP) correspondientes al manejo de agroquímicos.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No se exponga al contacto de la aspiración.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir el producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos, medicamentos, bebidas, ni forrajes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, vélea a la persona de la zona peligrosa y lleve inmediatamente al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
 - Ojos: Lavar con abundante agua y jabón.
 - Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
 - Inhalación: En caso de intoxicación por esta vía, retirarse para respirar aire fresco.
 - Ingestión: Búsqueda asistencia médica.
 - Nota al médico: Antídoto, no tiene tratamiento específico.
- En caso de emergencia llame a los siguientes teléfonos:
 SAMU: 106
 CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C.: (01) 5360448

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces en este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el triplavado o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y silvestre.
- No contaminar con desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con capa lítica o superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
 Modo de acción: Bioestim® Tribromopato, que promueve la división celular y formación de órganos de la planta, induce el tratamiento de yemas, estimula el inicio del botoneo, el desarrollo y el crecimiento radical, incrementando la producción y mejorando la calidad de la cosecha.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

- Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad.
- En un recipiente (parte) diluya la cantidad necesaria de Bioestim®, en un poco de agua vierta esta solución al tanque de la mezcla y complete con agua hasta la capacidad total.
- En el proceso de llenado y posterior aplicación, agitar constantemente.
- Una vez preparada la mezcla, deberá utilizarse en su totalidad el mismo día.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Recomendaciones de aplicación	DOSES (ml/litro de ZMBL)	P.C.	L.M.R. en ppm
VID	1.- Al inicio de botoneo 2.- Al inicio de floración 3.- Al inicio del cuajado	350 ml	Exento	Exento
ALCACHOFA	70 días después del trasplante	500 ml	Exento	Exento
PAPRIKA	60 - 70 días después del trasplante	500 ml	Exento	Exento

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

1 a 3 Aplicaciones por campaña
 Número de campañas al año: 1

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas y sustancias afines. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de efectuar la mezcla final en el tanque de aplicación definitivo.

FITOTOXICIDAD:

Bioestim®, no es fitotóxico para los cultivos en los que se recomiendan, siempre y cuando se empleen a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El usuario garantiza que las características físicas/líquidas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

