"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# RANCHAZEB®

## 800 WP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Mancozeb ..... 800 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p 1Kg

**Reg. PQUA Nº 2964 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Peru
Teléfono:+51-1-222-2795

**Formulador**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor:**
**VAK PERU EIRL**
Jr. Benjamin Doig Nro. 2776, San Martin de Porres,
Lima. Peru
Teléfono: + 51 941 917 214

**Nº de Lote:**
**Fecha de Formulación**
**Fecha de Vencimiento:**

**Contenido Neto: 1 KG**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realize la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- GRUPO QUIMICO: Ditiocarbamatos
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En case de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
SAMU: 106
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después deusar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositelaen el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RANCHAZEB® 800 WP** es un fungicida foliar con actividad preventiva, de amplio campo de acción, con especial actividad sobre enfermedades foliares producidas por hongos endoparásitos incluyendo rancha, manchas foliares y roya. **RANCHAZEB® 800 WP** se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Para infecciones bajas emplear la dosis mínimo y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**RANCHAZEB® 800 WP** es incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Consulte con un ingeniero agrónomo**

| Cultivo | Plage | | Dosis Kg/200L | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| CEBOLLA | MILDIU | *Peronospora destructor* | 0.6 | 7 | 1 |
| PAPA | RANCHA | *Phylophthora infestans* | 0.8 | 7 | 0.2 |

**PC:** Periodo de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA