"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BALANTA 20 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA DE USO AGRICOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Dinotefuran..... 200 g/Kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. Nº PQUA Nº 1802 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. El Polo Nº 401 Of. 610
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 051 713-9960

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C
Av. Nicolas Ayllon 2941, Piso 7
El Agustino - Santa Anita, Lima - Perú
Teléfono: 0511 644-9297

Contenido Neto: 1 Kg
Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-Evite almacenar por encima de los 35 °C.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotenoide.
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
-No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01-713-9960

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. .

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Peligroso para abejas.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Tóxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BALANTA 20 SG pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotinílicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.
BALANTA 20 SG se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.
Calibrar el equipo previamente.

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/Ha		
Esparrago	Trips	*Thrips tabaci*	1.0 - 1.5	21	0.5

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar previa evaluación.
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año.
Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 15 días en espárrago.
En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
BALANTA 20 SG no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.