

# TIRA

20

20



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

---

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

## POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Mancozeb..... 800 g/kg

Aditivos ..... csp 1 kg

**PQUA N° XXX-SENASA**

Titular del Registro:



**Tecnología Química Y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.  
Telf.: 612-6565,  
R.U.C N° 20307150981

Importado y Distribuido por:



**Talex Perú S.A.C.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565  
R.U.C N° 20513013826

Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co. Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China

Fecha de formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: **25 Kg**  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

## RETIRA

8

10

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspiración).
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- No renavasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Carbamato.
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
  - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
  - Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfono de emergencia:** TQC S.A.: (01) 6126565, SAMU 106
- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- "Peligroso para organismos acuáticos".
  - "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
  - "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
  - "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
  - "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
  - "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**S-SEKURA** es un fungicida de contacto, que actúa en forma preventiva contra una amplia gama de enfermedades que atacan a los cultivos. Su formulación altamente micronizada permite una mejor distribución, adherencia y persistencia en el follaje. Además, provee a la planta de elementos nutricionales de importancia como son el zinc y el manganeso.

**S-SEKURA** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Las aplicaciones se pueden hacer con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO        | PLAGA                        |                                   | DOSIS     | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
|                | NOMBRE<br>COMÚN              | NOMBRE<br>CIENTÍFICO              |           |                |                 |
| TOMATE         | "Hielito" o "Rancha"         | <i>Phytophthora infestans</i>     | 0.4 - 0.5 | 7              | 3.0             |
| PAPA           | "Mancha negra"               | <i>Alternaria solani</i>          |           |                |                 |
| ZAPALLO        | "Midiu"                      | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | 0.4-0.5   | 7              | 1.5             |
| MELÓN - SANDÍA | "Midiu"                      | <i>Peronospora destructor</i>     | 0.4-0.5   | 7              | 1.5             |
| CAPULLA, AJO   | "Midiu"                      | <i>Bremia lactucae</i>            | 0.4-0.5   | 10             | 0.6             |
| LECHUGA        | "Midiu"                      | <i>Bremia lactucae</i>            | 0.4-0.5   | 5.0            | 5.0             |
| VID            |                              |                                   |           |                | 5.0             |
| MANDARINA,     |                              |                                   |           |                | 5.0             |
| MARYGOLD       | "Podredumbre gris"           | <i>Botrytis cinerea</i>           | 0.4-0.5   | 7              | 0.1             |
| MELOCOTÓN      |                              |                                   |           |                | 2.0             |
| NARANJO        |                              |                                   |           |                | 5.0             |
| MELOCOTÓN      | "Hoja encrespada" o "Oleosa" | <i>Taphrina deformans</i>         | 0.4-0.5   | 7              | 2.0             |
|                | "Cercosporiosis"             | <i>Cercospora asparagi</i>        |           |                |                 |
| ESPARRAGO      | "Mancha plúrea"              | <i>Stemphylium vesicarium</i>     | 0.6       | 7              | 0.5             |
|                | "Roya"                       | <i>Puccinia asparagi</i>          |           |                |                 |
| PAPRIKA        | "Podrición gris"             | <i>Botrytis cinerea</i>           | 0.6 - 1.2 | 7              | 5.0             |

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 7 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 4 a 5 días si las condiciones de temperatura y humedad favorecen el desarrollo del hongo.

Para lechuga, realizar hasta 4 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

