

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir ni aspirar el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No inhalar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyrethroid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Aviso: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CETOX: Línea gratuita de Emergencia Tel.: 0800-19191; SAMU Tel.: 105; DROKASA PERÚ S.A. Tel.: (01) 501-1000**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vértalo a un lugar seguro.
- No reutilice el envase para otros fines.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- El producto debe usarse en la etapa de fructificación o crecimiento del fruto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranza de producto.
- Retirar una banda de no aplicación hasta un cuerpo de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que animales entren en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

FILTER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN
 Chlorfenapyr 240 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
 Magdalena del Mar
 Telf: (01) 501-1000

FORMULADO POR:

Kindai Chemicals Co., Ltd.
 8F, Yuesheng International Center,
 No. 518 Pingliang Road, Qianjiang Century City,
 Hangzhou, China

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Calamagüilla 1ra etapa, Parcela 62 Lt. B y Sub Lote,
 Parcela 64, Lt. B, Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FILTER, es un insecticida con actividad sistémica limitada, translocar. Principalmente es de acción por contacto e ingestión.

FILTER actúa como desecopador de foliaridad oxidativa en las mitocondrias, lo que provoca una interrupción de la producción de ATP, la muerte celular y, en última instancia, el control del tripe de maíz en el cultivo de vid.

Preparación de la mezcla

FILTER, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo a mojarla según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión "arrestre".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	PLAGA	DOSIS	PC LMR
Vid	"Tipo de maíz"	Frankliniella occidentalis	3.75 - 1.0	15 días ppm
				15 0.01

PC: Período de carencia en días
 LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en época de fructificación del cultivo cuando la plaga este presente. Realizar como máximo 01 aplicación por campaña considerando una campaña al año para el cultivo de vid.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FILTER es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina, ácidos fuertes y agentes oxidantes, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

