

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Bupro-Forte Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

**Composición:**

Acetamiprid .....	250 g/kg
Buprofezin .....	250 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfono: (1) 222-2795



**Formulador:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengling Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor:**

**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,

Miraflores, Lima, Peru

Teléfono: (1) 222-2795



Fecha de Formulación

N° de Lote

**CONTENIDO NETO: 400 g**

Fecha de Vencimiento

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoide + Thiazidiazine
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / INFOSALUD: 113

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: (1) 222-2795

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútil en la funda o bolsa contándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- Peligroso para organismos acuáticos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida **BUPRO-FORTE DUO** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200 L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	Dagbertus	<i>Dagbertus minensis</i>	0.20	21	*0.01 **0.01
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.20	3	*2.0 **0.01

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Acetamiprid \*\*Buprofezin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **BUPRO-FORTE DUO** cuando la plaga esté presente. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña por año, para palto y arándano.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Evite el contacto con ácidos fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

**BUPRO-FORTE DUO** no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

