

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Bupro-Forte Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:

Acetamiprid ..... 250 g/kg  
Buprofezin ..... 250 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3032 - SENASA

**Titular de Registro:**  
**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (1) 222-2795

**Formulador:**  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor:**  
**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (1) 222-2795

Fecha de Formulación  
N° de Lote  
Fecha de Vencimiento



CONTENIDO NETO: 800 g

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA  
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y  
APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide + Thiadiazine
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / INFOSALUD: 113

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (1) 222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE  
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida **BUPRO-FORTE DUO** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO  
AGRÓNOMO”

| Cultivo  | Plaga           |                               | Dosis<br>L/200<br>L | P.C.<br>(días<br>) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|          | Nombre<br>común | Nombre<br>científico          |                     |                    |                 |
| Palto    | Dagbertus       | <i>Dagbertus<br/>minensis</i> | 0.20                | 21                 | *0.01<br>**0.01 |
| Arándano | Mosca<br>blanca | <i>Bemisia tabaci</i>         | 0.20                | 3                  | *2.0<br>**0.01  |

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Acetamiprid \*\*Buprofezin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **BUPRO-FORTE DUO** cuando la plaga esté presente. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña por año, para palto y arándano.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Evite el contacto con ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

**BUPRO-FORTE DUO** no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

