

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM

03 DE OCTUBRE 2023

AG

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Midway®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Pyridaben450.0 g/L
Aditivos c.sp. 1 L

Reg. PQUA N° 3033-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:



Av. Javier Prado Este N° 6210.
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401. La Molina. Lima - Perú.
Central telefónica: (511) 4193000
www.corpmontana.com

Contenido Neto: 5L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Tóxico si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM

03 DE OCTUBRE 2023

AG

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGRO. Tóxico si se inhala. Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Utilice respirador o máscara respiratoria.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyridazinone
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / MONTANA S.A.: (01) 4193000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas. Nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de acción: MIDWAY es un acaricida no sistémico que actúa por contacto e ingestión indicado para el control de los estados móviles de los ácaros (larvas, ninfas y adultos). Asimismo, posee acción sobre huevos ya que éstos no llegan a eclosionar o dan origen a larvas inactivas. Otorga un prolongado periodo de control.

Mecanismo de acción: actúa a nivel de la respiración celular, inhibiendo el transporte de electrones mitocondrial en el complejo I; de esta manera los ácaros no pueden producir energía y presenta un rápido efecto de derribe.

Modo de empleo: MIDWAY se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Table with 5 columns: CULTIVO, Nombre Común, Nombre Científico, DOSIS (L/200 L), PC (días), LMR (ppm). Rows include Vid, Mandarino, and Palto.

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1400 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: MIDWAY debe aplicarse al inicio de la infestación. Se recomienda una aplicación por campaña en el cultivo de vid, considerando 2 campañas al año. En el cultivo de mandarino y palto se recomienda realizar una aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: MIDWAY es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda una prueba de compatibilidad previa o consultar con nuestro departamento técnico.

FITOTOXICIDAD: MIDWAY no es fitotóxico en el cultivo indicado a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3
MODERADAMENTE PELIGROSO

