

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No contiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:

SAMU: 106

NOVALTY: (01) 688-2986

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de apoyo autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto desechos o envases vacíos.



MAXBOT

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (Cepa.AMCB21) 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

*Correspondiente a 10⁸ u.f.c./ml

Registro N° 0137-SENASA-PBA-ACBM

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por:



Rio Viejo 57-59, Polígono Industrial La Isla,
41703 Dos Hermanas, Sevilla, España
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Titular e importador:



Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla del
Estanque San Borja, Lima - Perú
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

N° de lote:

Contenido neto: 1 LT

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MAXBOT, es un fungicida de amplio espectro en base al Agente de Control Biológico *Bacillus amyloliquefaciens*. Se usa para controlar diferentes patógenos fúngicos tanto aéreos como de suelo.

MAXBOT, inhibe la germinación de esporas y degrada el tubo germinativo y el micelio de los patógenos fúngicos produce un control efectivo de la enfermedad sin originar resistencia.

MODO DE EMPLEO:

MAXBOT, es un fungicida biológico usado para el control de enfermedades causadas por hongos, es de uso foliar y radicular combatiendo un amplio espectro de patógenos.

Usar de preferencia en un pH 6 y en un recipiente con agua, diluir la dosis recomendada de **MAXBOT** hasta su dilución completa, luego agregar el total de agua, agitar bien y aplicar tratando de lograr una total cobertura sobre el área a tratar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	Días	ppm
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.7	-	N.A.	N.A.
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	-	N.A.	N.A.
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.6	1.2	N.A.	N.A.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Frecuencia de aplicación en Palto y Papa:

Número de aplicaciones/campaña: 2

Número de campañas/año: 1

Arandano:

Gasto de agua: 600 a 800 litros de agua por hectárea.

Etapas fenológicas: Floración

Número máximo y frecuencia de aplicación: 2 - 4 veces por campaña, intercalando con otro producto de diferente modo y mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:

MAXBOT, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

