RANCHAPAJ®

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

- APLICACIÓN:

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,
- medicinas, bebidas ni forraies.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

 Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- personas.

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.

 • En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua
- fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Agro Klinge S.A.

RANCHAPAJ

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Metalaxyl . Mancozeb. .. 80 g/kg . 640 g/kg c.s.p 1 kg

Reg. N° 526-97-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



Agro Klinge S.A. Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

NO INFLAMABLE



Termulador:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima -Perú
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020

R.U.C N° 20307150981

Contenido Neto: 500 g

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE **DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRODUCTO PERUANO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" 'MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS'

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RANCHAPAJ es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro, que combina la acción de dos fungicidas no relacionados. Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto. Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R. (ppm)	
CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200 L	Kg/ha	(días)	mancozeb	metalaxy
TOMATE PAPA	"Hielo" o "Rancha" o "Seca seca"	Phytophthora infestans	0.5 - 1	2 - 3	3 14	2 0.2	0.5 0.05
AJÍ ROCOTO PIMIENTO	"Hielo"	Phytophthora infestans	0.5 - 1	2 - 3	14	10 10 1	10 10 1
SANDÍA MELÓN PEPINO	"Mildiu"	Pseudoperonospora cubensis	0.5 - 1	2 - 3	7	1 0.5 2	0.2 0.2 0.5
AJO CEBOLLA	"Mildiu"	Peronospora destructor	0.5 - 1	2 - 3	14	0.5 0.5	N.D. 2
LECHUGA	"Mildiu"	Bremia lactucae	0.5 - 1	2 - 3	7	10	2
TOMATE PIMIENTO PAPRIKA	"Azul" o "Morado"	Phytophthora capsici	0.5 - 1	2 - 3	14	2 1 1	0.5 1 1
VID	"Mildiu"	Plasmopara viticola	0.5 - 1	2 - 3	14	5	1
COL COLIFLOR	"Mildiu"	Peronospora parasitica	0.5 - 1	2 - 3	14	5 N.D.	0.5 0.5
PALTO	"Podredumbre radicular"	Phytophthora cinnamomi	0.5		21	0.05	0.2
P.C.= Per	íodo de carencia	.M.R.=Límite máxim	o de res	iduos	N.D.=	No deteri	ninado

P.C.= Período de carencia L.M.R.=Limite maximo de residuos N.D.= No determinado VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos 400 a 600 L/ha, frutales 1 000 L/ha. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la

aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: No es fitotoxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.













































altura: 14.80 cm ancho: 11.00 cm profundidad: 8 cm

Colores Logo: Selección Texto y logo: NEGRO Banda: Azul pantone 293C

Lateral Izquierdo v Derecho 7.3 pt. Usos especificos v otros 7 pt.



















