

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# GHODA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Cyazofamid..... 100 g/kg  
Cymoxanil..... 300 g/kg  
Aditivos c.s.p..... 1 kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular del Registro:

**SOLUCIONES TÉCNICAS  
DEL AGRO S.A.C.**

Av. Guillermo Dansey 2176,  
Lima Cercado  
Tel.: (511) 336 8645

Formulador:

**UPI CROPSOURCE CO., LTD**

Tel.: (511) 336 8645

C-312 Hi-Tech Information Plaza No.8

Huatian Road Huayuan Tianjin

City 300384 P.R. China

Teléfono: 86-022-23707336

Fax: 86-022-23707631

Importado y distribuido por:

*Soltagro*®

Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

**SOLUCIONES TÉCNICAS  
DEL AGRO S.A.C.**

Av. Guillermo Dansey 2176,  
Lima Cercado  
Tel.: (511) 336 8645

**Contenido Neto: 5 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS



**PELIGRO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas después de la aplicación.
- El periodo de reentrada al área tratada será de un mínimo de 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos Químicos: Cyanoimidazole y Cyanoacetamide oxime.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106 / SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO: (+51) 3368645.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar la contaminación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GHODA es un fungicida traslaminar y sistémico que actúa por contacto.

GHODA es un fungicida que combina la acción de los ingredientes activos: Cyazofamid, un inhibidor específico de la cadena respiratoria mitocondrial de hongos oomicetos, y Cymoxanil, afecta la síntesis de ADN y en menor grado la de RNA en los hongos.

GHODA puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre calibrado. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, con dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 12 horas después de la aplicación. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

GHODA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA        |                               | DOSIS<br>Kg/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)      |
|---------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
|         | Nombre común | Nombre científico             |                |                |                      |
| Papa    | “Rancha”     | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.75           | 14             | 0.01 (a)<br>0.01 (b) |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

(a) Cyazofamid  
(b) Cymoxanil

