

# SANIMECTIN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Emamectin benzoate..... 50 g/Kg  
Lufenuron ..... 100 g/Kg  
Aditivos csp ..... 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
**SANIVEG PERU S.A.C**  
Av. San Jenaro 235  
Urb. Industrial, Puente Piedra  
Teléfono: 637 - 1269

Formulado por:  
**SHARDA CROPHEM LIMITED**  
Prime Business Park, Dashrathlal  
Joshi Road, Vile Parle (W),  
Mumbai – 400 056 – INDIA  
Telf: (91) 22 6678 2800



**Contenido Neto: 1 Kg**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala



**ATENCIÓN**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersion.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SANIMECTIN** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoate es un insecticida no sistémico y translaminar, Lufenuron que actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la muda. **SANIMECTIN** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar **SANIMECTIN** al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Realizar máximo 1 aplicación por campaña, teniendo como máximo 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

SHARDA PERU: 222-2695

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/cil	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	"Gusano grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	7	0.02 <sup>1</sup> 0.8 <sup>2</sup>

P.C. : Periodo de carencia

LMR : Límite máximo de residuos

<sup>1</sup> Emamectin benzoate, <sup>2</sup> Lufenuron

**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

