



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo mojable – WP

Composición:
Copper Hydroxide.....770 g/Kg
Aditivos c.s.p.....1 Kg

Reg. PQUA N° 2214 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: NUTRITEC COMPANI S.A.C.

Jr. Santiago Crespo 421 San Luis
Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz



FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE- CHEMICAL CO.,LTD.
9th Floor, No. 58, Nanhu Road,
Nanjing - China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: NUTRITEC COMPANI S.A.C

Jr. Santiago Crespo 421 San Luis
Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz

Lote N:
Fecha Fab:
Fecha Venc:

Contenido Neto:
1 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Producto toxico para preces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de naturaleza ácida o alcalina. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HIDROX- CU Es un fungicida preventivo a base de Hidróxido de Cobre. El cobre es más eficaz contra las esporas que el micelio fúngico establecido, así que debe ser aplicado antes o en el inicio de la enfermedad. Aplicar la dosis recomendada em 2 momentos oportunos:

1) Injertación (vivero): Para impedir el ingreso de la enfermedad en plantas jóvenes.
2) Plantas adultas: pulverización después de la poda hasta el inicio de la maduración de frutos.

- Al momento de injertar se hace una pasta al 4%/100 del producto comercial y se introducen las dos partes del injerto(Patrón y púa) por 30", se unen las partes y se pulveriza exteriormente con el producto, a la misma dosis empleada en el tratamiento de sumersión.
- En plantas adultas se procede a aplicar (pulverizar) después de la poda, en el tejido sano de las plantas hasta el inicio de maduración de los frutos. Si hay lesiones de enfermedades, se retira el tejido afectado en las ramas del tronco de los arboles, se limpia con leña y luego cubrir las zonas de poda con una pasta de HIDROX-CU al 1%.
- Preparar una pre-mezcla, diluyendo el producto en un poco de agua, agitar y verter al tanque del equipo, luego completar el resto del agua al volumen requerido.
Gasto promedio: 800 L / Ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (DÍAS)	LMR (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mango	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	En campo: 3 plantas	12	1
			En viveros: 4 plantas		

L.M.R. Limite Máximo de Residuos

P.C. Período de carencia

ppm: Partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar HIDROX-CU de manera preventiva, antes de la aparición de la enfermedad. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Frecuencia de aplicación mínima 14 días. Sin embargo, este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada antes de los 48 horas de la aplicación.

