

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# KONIG<sup>®</sup> 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

## COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2648 - SENASA

Titular del registro: **INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfonos: (01) 499-7831



Formulado por: **NANTONG DADING CHEMICAL CO., LTD.**  
Chemical Industry Zone Yangkou,  
Rudong, Nantong, China

Importado y Distribuido por: **PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C**  
Av. Nicolás Arriola 2374  
San Luis, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 20L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C. (01) 499-7831**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces u otros organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.



- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**KONIG® 350 SC** es un insecticida de acción sistémica, de contacto e ingestión, actúa interfiriendo los receptores nicotínicos de la acetilcolina del sistema nervioso del insecto causando un bloqueo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme, luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Espárrago, pimiento y tomate: realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña, considerando como máximo 2 campaña/año.

Arándano, mandarina y palto: realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando como máximo 1 campaña/año.

### PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

### COMPATIBILIDAD

Debido a su especificidad se recomienda aplicar solo con un surfactante sin mezcla con otros plaguicidas.

### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA                   |                               | DOSIS<br>(ml/200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN            | NOMBRE CIENTÍFICO             |                    |              |              |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 250                | 7            | 0.05         |
|           | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>         | 200                | 21           | 1            |
| Pimiento  | Prodiplosis             | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 200                | 21           | 1            |
| Tomate    | Prodiplosis             | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 200                | 21           | 0.5          |
| Arándano  | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>          | 150 - 200          | 3            | 5            |
| Palto     | Queresa                 | <i>Florinia florinae</i>      | 150                | 7            | 1            |
| Mandarina | Minador de la hoja      | <i>Phyllocnistis citrella</i> | 100 - 150          | 30           | 1            |

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

