

14.0 x 28.0 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Triazopyrimidine y Pyridine compound
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO: 2663828, 944696937

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**CHUBASQUERO-AG®****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****HERBICIDA AGRÍCOLA****DISPERSIÓN OLEOSA - OD****COMPOSICIÓN:**

Penoxsulam.....27.7 g/L  
 Triclopyr.....230.6 g/L  
 Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° xxxx - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -  
 Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
 info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.**

Room 2105. QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Chung Lee Street Chai Wan, Hong Kong,  
 China . Telf 0085-229-738324

**IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:****NOVAGRO-AG S.A.C.**

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura -  
 Paita - Paita, Perú . Teléfono: 273330  
 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
**Contenido Neto : 4 L**  
 Fecha de Vencimiento :

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en caso de contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**NovAgro-AG®**  
 "Aceleramos la transición hacia la producción de frutas  
 y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

**Muy tóxico para**  
**organismos acuáticos**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CHUBASQUERO-AG** es un herbicida post emergente sistémico aplicado para el control de malezas citadas en cuadro de usos, se absorbe a través de las hojas, raíces y brotes. Triclopyr actúa induciendo una respuesta epinástica en las plantas conduciendo a la cesación del crecimiento normal y la muerte, mientras que Penoxsulam inhibe la enzima vegetal acetolactato sintasa (ALS), enzima clave en la biosíntesis de los aminoácidos de cadena ramificada.

Para la preparación de la mezcla:

- Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.

- Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plagas                                                  |                                                                                                                 | Dosis     | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|         | Nombre común                                            | Nombre científico                                                                                               | L/ha      |                |                |
| Arroz   | Coquito<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Pata de gallina | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Echinochloa crus-galli</i><br><i>Eleusine indica</i> | 1.5 - 1.8 | 60             | 0.01*<br>0.3** |

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

\* Penoxulam

\*\* Triclopyr

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año, en malezas en activo crecimiento y al inicio de la fase vegetativa del cultivo (plántulas con emergencia de macollamiento o ahijamiento).

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda ingresar luego de 12 horas después de la aplicación, con el equipo de protección adecuado.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. Se recomienda evitar el contacto con materiales oxidantes. Se sugiere realizar pruebas previas de compatibilidad y fitotoxicidad, antes de una aplicación comercial.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO****PELIGRO**