

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Caudillo® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Pymetrozine .....500 g / Kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**CAPEAGRO S.A.C.**



**IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR:**

**FORMULADO POR:**

**Oasis AgroScience Limited**

Room 1510, No 500, Xinjian RD, Shangai  
CHINA.

**CAPEAGRO S.A.C.**

Av. Benavides 2150. Ofic. 803  
Miraflores - Lima

[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **500g**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyridine Azomethines.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleva al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106

CAPEAGRO S.A.C.: 01-445-5346

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Caudillo 50 WG** es un insecticida derivado de un nuevo tipo de química que es altamente selectivo contra los insectos chupadores de plantas. Penetra en hojas verdes y se transporta sistémicamente dentro de la planta. La pimetrozina previene rápidamente la alimentación de los áfidos y, aunque no hay un efecto de calda inmediata, los áfidos no se alimentan nuevamente y la muerte ocurre por inanición dentro de 1-4 días.

**Modo de preparación:** Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **Caudillo 50 WG** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación en la fase de crecimiento vegetativo y floración, con un máximo de dos aplicaciones/campaña considerando dos campañas al año.

### PERIODO DE REINGRESO:

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

### COMPATIBILIDAD:

Compatible con plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda evaluar las posibles mezclas antes de su uso definitivo en campo. Sustancias a evitar: ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS	PLAGA		DOSIS	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	(Kg/Ha)		
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia Tabaci</i>	0.40 - 0.50	3	0.1

\*P.C.: Periodo de carencia

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos

