MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Caudillo® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE (WG)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

COMPOSICIÓN:

Pymetrozine .....500 g / Kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
Oasis AgroScience Limited
Room 1510, No 500, Xinjian RD, Shangai
CHINA.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: **1 Kg**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Pyridine Azomethines.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleva al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
CAPEAGRO S.A.C.: 01-445-5346

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Caudillo 50 WG es un insecticida derivado de un nuevo tipo de química que es altamente selectivo contra los insectos chupadores de plantas. Penetra en hojas verdes y se transporta sistémicamente dentro de la planta. La pimetrozina previene rápidamente la alimentación de los áfidos y, aunque no hay un efecto de caída inmediata, los áfidos no se alimentan nuevamente y la muerte ocurre por inanición dentro de 1-4 días.

Modo de preparación: Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **Caudillo 50 WG** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda la aplicación en la fase de crecimiento vegetativo y floración, con un máximo de dos aplicaciones/campaña considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:
El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda evaluar las posibles mezclas antes de su uso definitivo en campo. Sustancias a evitar: ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS	PLAGA		DOSIS	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	(Kg/Ha)		
Pimiento	Mosca blanca	*Bemisia Tabaci*	0.40 - 0.50	3	0.1

***P.C.:** Periodo de carencia **L.M.R.: Límite máximo de residuos