

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evite su ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental no inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Trasladar de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, repitiendo la operación de lavado si la irritación persiste. Obtenga atención médica.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. Acudir al médico.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, tendido y en reposo. Obtenga atención médica.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106
BIOTECNIA DAYMSA DE PERÚ: (01) 348-2680

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



NEMATON

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Extracto de canela 309 g/L
Extracto de pino 68.5 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro: **BIOTECNIA DAYMSA DE PERÚ S.A.C.**

RUC: 20506885851

Dirección fiscal: Av. Los Ingenieros N° 207,

Urb. Industrial La Merced, Ate, Lima, Lima.

Teléfono: (01) 348-2680



Formulado por:

Desarrollo Agrícola y Minero S.A.

Dirección: Camino de En medio 120, 50013, Zaragoza

ESPAÑA

Teléfono: +34976461516

Importado y distribuido por: **BIOTECNIA DAYMSA DE PERÚ S.A.C.**

RUC: 20506885851

Dirección fiscal: Av. Los Ingenieros N° 207,

Urb. Industrial La Merced, Ate, Lima, Lima.

Teléfono: (01) 348-2680

F. de Formulación:

N° Lote:

Contenido neto: 5 litros

F. de vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEMATON es un nematocida biológico de contacto. El extracto de canela actúa inhibiendo el crecimiento por la inhibición de las ATPasas y la biosíntesis de la pared celular cambiando la estructura e integridad de ésta. El extracto de pino afecta la membrana de los juveniles: roturas y disgregación.

Modo de empleo: Para su aplicación, agitar el producto antes de diluir NEMATON en la dosis indicada en el tanque de fertirrigación, manteniendo una ligera agitación. El suelo debe estar húmedo cuando se aplique el producto, y debe evitarse que éste se lave de la zona radicular. Realizar la aplicación en la última parte del riego. Después de la aplicación, continuar el riego durante algunos minutos para lavar los sistemas. Puede ser aplicado a través del riego por goteo u otro similar de baja presión y/o riego por gravedad, utilizando la cantidad de agua necesaria para cubrir el área de raíces de las plantas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L./Ha.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Nemátodo del nudo	Meloidogyne incognita	5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

N.A. No aplica

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar dos (2) aplicaciones por campaña en los períodos de crecimiento radicular.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No mezclar con productos de marcada naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD

NEMATON no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Ancho: 28 cm
Alto: 15 cm