

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y etiquetado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica.

No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencias:

SAMU: 106

SMTM PERU S.A.C: 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar lagos, ríos, estanques con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ReTain® SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Aviglycine HCl 200 g/L

(Aminoethoxyvinylglycine hydrochloride)

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. RCP XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C

Av. Circunvalación Del Club Golf

Los Incas, N° 208.

Interior 705-B, Torre III. Urb. Club Golf

Los Incas.

Santiago de Surco. Lima – Perú

FORMULADO POR:

VALENT BIOSCIENCES
Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way,
Suite 100
Libertyville, IL 60048
Estados Unidos
1-800-323-9597

Contenido neto: 4 L.

Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de expiración:

INSTRUCCIONES DE USO

ReTain SL es un regulador de crecimiento de origen natural, que bloquea temporalmente la síntesis de etileno endógeno. Disminuye la caída de frutas precosecha e incrementa el cuajado de frutos en el cultivo de Palto.

Modo de empleo: Vaciar la dosis de ReTain SL en un balde con agua y agitarlo; vaciar la solución en un cilindro, completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre científico	Dosis		Momento de aplicación	PC	LMR (ppm)
		mL/200L	L/Ha			
Palto	Persea americana	150 - 300	0.60 -1.20	Floración	14	0.06

P.C: Período de carencia. L.M.R: Límite máximo de residuos.
Volumen de agua: 800 L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña/año durante la floración o cuaje de frutos.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda aplicar el producto solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que

las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

