

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CRECIGIB<sup>®</sup>

## 40 SG


REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

### COMPOSICIÓN:

Gibberellic acid ..... 400 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1Kg

Reg. RCP N° 097 - SENASA



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por: POINT ANDINA

S.A. Calle Los Tulipanes 147 Of 701B, Surco.

Lima - Perú.

Teléfono 348 1018

Formulado por: POINT AGRO-CHINA Ltd

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Contenido Neto: 50 g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

# “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Puede causar irritación a los ojos y piel. • Evite su ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: No inducir al vómito, busque atención médica inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua, si la irritación persiste obtenga atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, verifique y quítese los lentes de contacto. Lave con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, tendido y en reposo. Obtenga atención médica.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106; POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018;  
CISPROQUIM: 0800-50847**

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS g/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
VID	Para incrementar el diámetro de las bayas y longitud del racimo.	Aplicar cuando las bayas alcancen 10-14 mm de diámetro.	10	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia (días)    LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.    N.A.: No aplica

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CRECIGIB 40 SG** es un regulador de crecimiento hormonal que estimula el crecimiento de las células, actuando en los procesos fisiológicos y morfológicos de las plantas.

Modo de empleo: Calibrar el equipo de aplicación, disolver previamente los gránulos de **CRECIGIB 40 SG** en una cantidad reducida de agua. Agregar luego el volumen de agua a emplearse en el cultivo. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre o por inmersión. Se recomienda usar el agua a pH entre 5.5 a 6.5. Las soluciones de **CRECIGIB 40 SG** deben utilizarse el mismo día de su preparación. No aplicar en días con probabilidades de lluvia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda realizar hasta 02 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 5 a 7 días en el cultivo de vid.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD: CRECIGIB 40 SG** no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

