

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TORAFLEX 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole.....500 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L


Registro PQUA N°2281 SENASA

Titular del registro: **Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.**

Formulador: **Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co., Ltd.**

Room 10, Floor 4, 1398 Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, China

Teléfono: +86-21-50395038



Importador y Distribuidor: **Industria Tecnológica Agrícola Del Peru S.A.**

Av. Javier Prado Este 6210 Of. 201, La Molina, Lima – Perú

Teléfono +51 349-6805



Fecha de formulación:

Lote:

Contenido neto: **250 ml**

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX (511) 619-7090

SAMU 106

Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid	Procedimiento gris Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	4	0.05
Páprika	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	300	3	2.00

P.C.: Periodo de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid.

Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año.

Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

ATENCIÓN

