

14 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ARIA® 80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Fipronil	400 g/Kg
Imidacloprid	400 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 3095 - SENASA



Titular de Registro:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Importado y distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD.
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East
Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China.

Fecha de formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 100 g
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

NO EXPLOSIVO

19 cm

14 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Moderado irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirazole (Fipronil) + Neonicotinoide (Imidacloprid)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar abierto, alejado de la zona tratada, si es necesario, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar de beber nada si la persona está inconsciente.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ARIA 80 WG es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. ARIA 80 WG afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. Por su efecto sistémico controla las plagas indicadas en el cuadro de usos. Las aplicaciones de ARIA 80 WG se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En cebolla realizar máximo una aplicación por campaña, una campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

ARIA 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
Arañazo	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.15	3	0.005*/3.5**
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.1	40	0.005*/1.5**
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	14	0.02*/0.1**
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.1 - 0.15	0.3 - 0.45	21	0.005*/0.05**
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	21	0.005*/1.0**

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). Fipronil*, Imidacloprid**



19 cm