

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es Dañino. No ingerir.
- Puede irritar las vías respiratorias.
- Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: piretroide + neonicotinoide

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano para mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
INFOSALUD: 113

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multíctilo triturando o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- "Peligroso para las abejas". No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- "Peligroso para organismos acuáticos". No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva". "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables". "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro al fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

© Marca registrada BASF

Entigris®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSITION:

alphacypermethrin	220 g/kg
dinotefuran.....	140 g/kg
aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Q-BASE
We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF S.A.

Av. Brasil, 791

Bairro Eng. Neiva Guaratingueta
SP – Brasil

CONTENIDO NETO:
1 kg

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

**TÓXICO EN CASO DE
INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO
CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO



CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO

018

- Entirrigu** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interrumpiendo la transmisión normal de impulsos nerviosos específicamente en los receptores nicotínicos, los que le causa la parálisis y luego la muerte.
- Se debe de calibrar los **equipos** para una adecuada dosificación. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales (palanca **man**), estaciones o accionadas por tractores.
- Se recomienda el uso de **bombas** **de** como lleno o vacío y que generen gotas con tamaños no menores a 100 micras y que **logren** una cobertura de aproximadamente 30 gotas por cm².
- En general se recomienda que las aplicaciones no se hagan con temperatura mayor a 30° C, humedad relativa menor al 60% y velocidades de viento mayores a 10 km/h.
- Llenar el recipiente (**clind**) hasta la mitad con agua, agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea antes de llenar el equipo de aplicación.
- CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/Cil	kg/Ha		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.35	14	1.5 ⁽¹⁾ 9.0 ⁽²⁾
	Chinche de la espiga	<i>Oebalus poecilus</i>				
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tragodes orizicolus</i>				
Maíz	Chinche del maíz	<i>Sternaridea carmelitana</i>	90	0.27	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturalis</i>	250	0.375	ND	0.1 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

*PC: Período de carencia	**LMR Límite Máximo de Residuos	***ND: No determinado
--------------------------	---------------------------------	-----------------------

(1)^{3a} Alphacypermethrin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de **Entigris®** una vez por campaña, considerando una campaña por año, evitando aplicar en época de floración.
 - Maíz: aplicar desde el desarrollo vegetativo hasta inicios de apertura de panoja.
 - Papa: efectuar la aplicación en la etapa de emergencia (aparición de aprox. 80 % de las plantas luego de la siembra).
- PERIODO DE REINGRESO:**
- Se recomienda no reingresar antes de 24 horas de realizado el tratamiento.
- COMPATIBILIDAD:**
- **Entigris®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad.
- FITOTOXICIDAD:**
- No se han reportado efectos tóxicos en los cultivos recomendados.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se recomienda no reingresar antes de 24 horas de realizado el tratamiento.
- COMPATIBILIDAD:**
- **Entigris®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad.
- FITOTOXICIDAD:**
- No se han reportado efectos tóxicos en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."