

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es Dañino. No ingerir.
 - Puede irritar las vías respiratorias.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo químico: piretroide + neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA**
INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multíplolo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- "Peligroso para las abejas"
 - No aplicar en época de floración.
 - No aplicar en presencia de polinizadores
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños
 - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. "Evitar la deriva por el viento"
 - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
 - "Peligroso para organismos acuáticos"
 - "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"
 - "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
 - "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
 - "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
 - "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
 - "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
 - "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



Entigris®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICION:

alphacypermethrin 220 g/kg
dinotefuran 140 g/kg
aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° -SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO**

BASF Peruana SA
Av. O. R. Benavides 5915 –
Callao
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



FORMULADO POR:
SBM Formulation C.S.
621 Av. Jean Foucault – Z.I. 34535
Beziers Cedex, Francia

PARA:
BASF Agri-Production SAS
Z.I. Lyon Rue Jacquard 69727
Genay Francia

CONTENIDO NETO: 1 kg

No. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

**TÓXICO EN CASO DE
INGESTIÓN
NO CIVICO EN CONTACTO
CON LA PIEL
NO CIVICO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA LOS
ORGANISMOS
ACUÁTICOS**

*Marca registrada BASF



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Entigris® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interrumpiendo la transmisión normal de impulsos nerviosos específicamente en los receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.
- Se debe de calibrar los equipos para una adecuada dosificación. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales (palanca o motor), estacionarias o accionadas por tractores.
- Se recomienda el uso de botas, pantalones de como lino o vacío y que generen gotas por tamaños no menores a 100 micras y que logren una cobertura de aproximadamente 30 gotas por cm².
- En general se recomienda que las aplicaciones no se hagan con temperatura mayor a 30° C, humedad relativa menor a 60% y velocidades de viento mayores a 10 km/h.
- Llenar el recipiente (caldo) hasta la mitad con agua, agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea antes de llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/Cil	kg/Ha		
Arroz	Mosca minadora del arroz	Hydrellia virithi				
	Chinche de la espiga	Oebalus poecilus	-	0.35	14	1.5 ⁽¹⁾ 9.0 ⁽²⁾
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus				
Maíz	Chinche del maíz	Sthenaridea carmelitana	90	0.27	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotypes suturalis	250	0.375	ND	0.1 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

*PC: Periodo de carencia **LMR Límite Máximo de Residuos ***ND: No determinado
(1)Alphacypermethrin (2) dinotefuran

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de Entigris® una vez por campaña, considerando una campaña por año, evitando aplicar en época de floración.
- Maíz, aplicar desde el desarrollo vegetativo hasta inicios de apertura de panoja.
- Papa, efectuar la aplicación en la etapa de emergencia (aparición de aprox. 80 % de las plantas luego de la siembra).

PERIODO DE REINGRESO:

- Se recomienda no reingresar antes de 24 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD:

- Entigris® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- No se han reportado efectos tóxicos en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO