

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Larvasac®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Emamectin benzoate 50 g/Kg
 Lambda-cyhalothrin 100 g/Kg
 Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 3989 - SENASA

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru
 Teléfono: (01) 222-2795



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
 Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:



Av. República de Panamá 2577
 La Victoria, Lima-Perú
 Teléfono: (1) 710-4068

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 200 G

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
 ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
 NIÑOS”

- “Este producto es DAÑINO. No ingerir”
- “Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”
- “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”
- “En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”
- “Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”
- “Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”
- “Peligroso para organismos acuáticos”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
 NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.: (01) 222-2795

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Esparrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	28	0.01* 0.02**
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	5	0.02* 0.01**
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	14	0.005* 0.02**

P.C.: Periodo de carencia
 * Emamectin benzoate

L.M.R.: Límite máximo de residuos
 **Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción

