

EMBARK 90 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición:

Emamectin benzoate20 g/L
 Flonicamid70 g/L
 Aditivosc.s.p. 1 L

PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

FARBIC CONSULTORES S.A.C.



Importado por:

Farbic Consultores S.A.C.
 Ca. Pucallá 324 Dpto. 201
 Urb. C.C. Monterrico, Santiago de Surco, Lima – Perú
 Teléfono +51 983275666 / www.farbic.pe

Formulado por:



SINERIA HOLLAND BV
 Randwycksingel 206229 EE Maastricht, The Netherlands
 Tel. +31 (0)43 2041120 / www.sineria.com

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 100 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCION
 - Nocivo en caso de ingestión
 - Nocivo en contacto con la piel
 - Nocivo si se inhala
 - Causa irritación a la piel
 - Causa irritación moderada a los ojos
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- ### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Avermectina + Pyridine
 - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral; si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Titular del registro: FARBIC CONSULTORES S.A.C. +51 983275666



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	7	0.01* / 0.03**
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	7	0.01* / 0.03**

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
 Volumen de agua por hectárea: Espárrago: 600L / Palto: 1000L *Emamectin benzoato / **Flonicamid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar EMBARK 90 SC, dirigido al follaje del cultivo cuando éste se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar 01 aplicación por campaña al año. Considerar 01 campaña al año para cultivos de palto y espárrago.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro, o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

